

ОПИСАНИЕ МЯГКОТЪЛЫХЪ

ИЗЪ РОДОВЪ

A N O D O N T A I U N I O,

НАЙДЕННЫХЪ

ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ г. Харькова.

П. Степановъ.

ГХИЛДОЛТЫИ НІНАОПО

алодоя аспа

• О И И У - Н А Т И О Д О И А

ажиннадыл

секомадж л ахтобонтое ско же

М. Г. Семёнов

Различные виды мягкотѣлыхъ, водящихся въ европейской Россіи и Сибири, еще весьма мало изучены. Многіе изъ нашихъ ученыхъ занимались собираниемъ раковинъ и ихъ описаніемъ, знаменитые наши путешественники постоянно обращали вниманіе на географическое распределеніе этихъ животныхъ; но результаты всѣхъ такихъ наблюдений пока весьма неполны. Замѣчаніе это вѣрно не только относительно морскихъ формъ, но также прѣсноводныхъ и сухопутныхъ, и Middendorff въ своихъ изслѣдованіяхъ постоянно указывалъ на эту неполноту¹.

Наша мѣстность заставляетъ также въ этомъ отношеніи еще многаго желать. Правда, бывшій профессоръ нашего университета Криницкій сосредоточилъ свою ученую дѣятельность главнымъ образомъ на изученіи мягкотѣлыхъ европейской Россіи, между которыми описано имъ также много видоизмѣненій, принадлежащихъ окрестностямъ Харькова; но работы его далеко не могутъ быть названы законченными,—заключеніе, которое мы вправѣ сдѣлать на основаніи сравненія нашей мѣстности съ другими болѣе обслѣдованными; заключеніе это подтверждаютъ также отчасти наблюденія мои надъ видами *Anodonta* и *Unio*, найденными мною близъ Харькова, изложеніе которыхъ и послужитъ содержаніемъ предлагаемой статьи.

¹ Grundriss für eine Geschichte der Malacozoographie Russlands. Bulletin d. nat. de Moscou. 1848. T. XXI. S. 425.

Въ общемъ каталогѣ мягкотѣлыхъ Криницкаго¹ упоминаются четыре рода мягкотѣлыхъ пластинчато-жаберныхъ, водящихся въ окрестностяхъ Харькова: *Anodonta*, *Unio*, *Cyclas* и *Pisidium*. Изъ р. *Anodonta* Криницкій находилъ *An. cellensis* Pf., *ventricosa* Pf., *anatina* L. и *intermedia* Lm.; изъ р. *Unio* — *U. pictorum* Lam. (*rostrata*, Pf.), *limosa* Nills. (*pictorum*, Pf.) и *tumida* Nills. При определеніи этихъ видовъ, какъ видно изъ каталога, Криницкій пользовался сочиненіями Lamarck-a, Nilsson-a и Pfeiffer-a; работы Rossmässler-a², которые во многихъ отношеніяхъ подвинули наши познанія о систематикѣ наядъ, не были имъ приняты во вниманіе; надо замѣтить впрочемъ, что въ то время вышли въ свѣтъ только первыя тетради сочиненія этого ученаго. При моихъ опредѣленіяхъ я главнымъ образомъ пользовался, равно какъ и другие ученые, работы которыхъ появились послѣ Криницкаго, какъ напр. Siemachko, Middendorff, трудомъ Rossmässler-a.

Своими тщательными изслѣдованіями надъ видоизмѣненіями различныхъ формъ, при-
наадлежащихъ къ родамъ *Unio* и *Anodonta*, Rossmässler успѣлъ опредѣлить извѣстныя
отношенія между видами р. *Anodonta*, тогда-какъ многія видоизмѣненія изъ р. *Unio*
описаны имъ какъ отдельныя формы. Какъ ни малочислены наблюденія мои надъ фор-
мами, водящимися близъ Харькова, тѣмъ не менѣе они успѣли заронить во мнѣ сомнѣ-
ніе относительно возможности примѣнить вполнѣ къ нашимъ наядамъ систематику, пред-
ложенную Rossmässler-омъ главнымъ образомъ для мягкотѣлыхъ этого семейства, извѣст-
ныхъ въ Германіи. Руководствуясь такими соображеніями, я считалъ болѣе удобнымъ описы-
вать найденный мною видоизмѣненія изъ *Unio* и *Anodonta* въ видѣ отдельныхъ разностей,
чтобы такими описаціями приготовить только материалъ для будущихъ изслѣдованій, въ
основаніи которыхъ должно быть положено точное изученіе мѣстныхъ условій и ихъ влія-
ніе на измѣненіе раковины нашихъ наядъ. Тѣмъ не менѣе я считалъ себя вправѣ от-
носить каждую разность къ одному изъ видовъ, описанныхъ Rossmässler-омъ, желая вы-
разить этимъ только то, что данная форма болѣе близко стоитъ къ такому-то виду,
нежели къ другимъ.

¹ Conchylia tam terrestria, quam fluvialilia et e maribus adjacentibus Imperii Rossici indigena, quæ pro-
mutua offerentur historiæ naturalis cultoribus commutatione A. J. Krynicki. Bulletin de la soc. des nat.
de Moscou. 1837. стр. 58.

² Iconographie der Land- und Süsswasser-Mollusken.

Изъ четырехъ видовъ *Anodonta*, упомянутыхъ въ каталогѣ Криницкаго, мнѣ удалось найти близь Харькова представителей только двухъ: *Anodonta cellensis* Rsm. и *An. anatina* Rsm.

Anodonta cellensis Schröt., *concha magna, ovato-oblonga, ventricosa, fragilis sulcata, anterius rotundata, posterius in rostrum obtusatum producta; margine superiore et inferiore parallelis, rectiusculis; ligamento elongato; sinu ligamentali ovali.*¹

Изъ вида *Anodonta cellensis* Rsm. я различаю главнымъ образомъ двѣ разности:

1) Раковина относительно величины тонкая, вздутая, удлиненная, темно-окрашенная съ грязножелтыми полосами. Наружная поверхность бороздчатая, а внутренняя молочно-блѣдаго цвѣта съ ясными отпечатками бороздъ. Вершина стерта, почти не возвышается. Верхній край прямой, опускается круто къ переднему и постепенно переходитъ въ задній край; передній край округленъ, а задніяя часть раковины оканчивается тупымъ концемъ; нижній край почти прямой, съ мало замѣтною выемкою. Мускульные отпечатки слабы. Связка продолговатая, мало выдающаяся. Вообще эта разность близко подходитъ къ формѣ, изображенной у Rossmässler-a на рис. 280.

Описанная нами форма отличается своими значительными размѣрами, которые уступаютъ развѣ только одной *Anodonta herculea* въ Сибири, описанной Middendorff-омъ. Тогда-какъ по Rossmässler-у *Anodonta cellensis* достигаетъ наибольшей величины 6", наша разность часто имѣеть величину $8\frac{1}{2}$ ", при этомъ высота раковины равняется 4", а ширина 2". Я находилъ ее только въ одномъ изъ прудовъ на Очеретянскихъ хуторахъ. Прудъ этотъ имѣеть тинистое дно, богатъ водяною растительностю и питается ключевою водою; по всей вѣроятности, совокупность такихъ благопріятныхъ условий и имѣла вліяніе на усиленный ростъ нашей *Anodonta*.

2) Раковина довольно тонкая, мало вздутая, яйцевидная. Наружная поверхность неровная, покрыта болѣе или менѣе замѣтными бороздками, цвѣта темнозеленаго или свѣтло-каштановаго. Перламутровый слой синеватаго цвѣта съ серебристымъ отливомъ, съ замѣтными отпечатками бородокъ. Верхній край прямой или съ небольшою кривизною; передніяя часть раковины съужена, а самыи край закругленъ; задніяя часть вытянута и конецъ ея нѣсколько приподнятъ кверху; нижніяя часть переднаго края незамѣтно переходитъ въ нижній край, а верхніяя образуетъ выемку; нижній край закругленъ, вершина придавинута очень къ переднему краю и почти не возвышается. Му-

¹ L. cit. Heft IV. 1836. S. 22.

скульные отпечатки слабы и часто вовсе незамѣтны. Связка продолговатая, почти не выдающаяся. Размеры раковины: длина $4\frac{3}{4}''$, высота $2\frac{1}{2}''$, ширина $1\frac{3}{8}''$. Водится въ рѣкахъ, протекающихъ чрезъ г. Харьковъ — Лопани и Харьковъ.

Задній край раковины описанной нами разности дѣлаетъ ее на первый взглядъ сходною съ *Anodonta anatina* Pf. Rsm., за которую она и была сначала принята мною; но верхній край прямой или съ едва-замѣтною кривизною, вмѣстѣ съ некоторыми другими особенностями — говорить противъ этого сходства. Въ такомъ-же заблужденіи, по всей вѣроятности, находился и Криницкій, внося нашу форму подъ именемъ *Anodonta anatina* L. въ свой каталогъ мягкотѣлыхъ; въ зоологическомъ кабинетѣ нашего университета хранятся экземпляры ея съ надписью Криницкаго.

Въ коллекціи Криницкаго хранится, кромѣ того, экземпляръ *Anodonta cellensis* Rsm. изъ рѣки Уды съ надписью — *Anodonta intermedia* Lam.; въ каталогѣ его также упоминается, что *An. intermedia* найдена близъ Харькова. Я не нахожу никакого особенного различія этой формы отъ описанной *Anodonta cellensis*, а потому считаю присутствіе *Anodonta intermedia* близъ Харькова какъ особаго вида недоказаннымъ. Въ настоящее время впрочемъ вообще высказаны сомнѣнія относительно самостоятельности этого вида, и Rossmassler, напр., готовъ считать его за недоразвитую *Anodonta cygnæa*. Вмѣстѣ съ этимъ подтверждаются слова Middendorff-a¹, что *Anodonta intermedia*, о которой упоминаетъ Криницкій въ своемъ каталогѣ (безъ описанія), должна быть вычеркнута изъ общаго списка мягкотѣлыхъ русской фауны.

Anodonta anatina L. (*Mytil.*) exempl. Nills., *concha minor, elliptico-ovata, fragilis, anterius rotundata, posterius in rostrum breve angulatum producta, superius subcurvata, inferius subretusa; umbonis extremitati antericri approximatis; ligamento prominulo*².

Видъ *Anodonta anatina* Rsm. имѣть представителемъ своимъ въ окрестностяхъ Харькова слѣдующую форму:

Раковина средней толщины, вздутая, овальная. Наружная поверхность неровная, ближе къ нижнему краю, — бороздчатая, цвѣта темно-сѣраго. Перламутровый слой имѣть синеватый отливъ. Верхній край подымается по направлению къ заднему; передняя часть раковины очень мало развита, округлена; задняя часть, быстро съуживаясь, оканчивается болѣе или менѣе заостреннымъ концомъ; нижній край округленъ. Вершина почти не возвышается и очень приближена къ переднему концу. Мускульные отпечатки за-

¹ Siebirische Reise. Mollusken. Bd. II. T. I. S. 399.

² Loc. cit. Heft V und VI. 1837. S. 57.

мѣтны. Связка небольшая, почти не выдается, чѣмъ главнымъ образомъ и отличается наша форма отъ *Anodonta anatina* Pf. и Rsm. Размѣры раковины: длина 4", высота $2\frac{1}{2}$ ", ширина $1\frac{1}{2}$ ". Найдена мною только въ пруду Жукова, близъ с. Лозовой; прудъ этотъ имѣть вязкое, глинистое дно, совершенно открытъ и питается ключевою водою.

Изъ трехъ видовъ р. *Unio*, упоминаемыхъ Криницкимъ въ своемъ каталогѣ, найдены мною близъ Харькова представители двухъ видовъ: *U. pictorum* Rsm. и *U. tumidus* Rsm.

Unio pictorum Lam., concha ovali oblonga, ventricosa, posterius in rostrum truncato-obtusatum producta, viridi-lutescens (*fuscocingulata*), posterius virescens; margine super. rectiusculo, inferiore subretuso; dentibus cardinalibus compressissimis, acuatiss, crenatis, sinistrorum posteriore minore vel evanescente¹.

Unio pictorum встречается близъ Харькова въ видѣ одной формы, которая довольно близко подходитъ къ общему описанію этого вида Rossmassler-a.

Раковина средней толщины мало вздутая, удлиненная. Наружная поверхность зеленаго цвѣта, въ нѣкоторыхъ частяхъ желтоватая, блестящая, съ одною или двумя продольными темными полосами, гладкая, переходящая только въ задней части въ бороздчатую. Перламутровый слой синеватаго оттенка. Верхній край и нижній прямые. Передняя часть раковины болѣе или менѣе съужена и округлена, а задняя вытягивается и оканчивается заостреннымъ концемъ. Зубцы замка развиты, сжаты и оканчиваются лезвеемъ. Вершина нѣсколько загнута впередъ и покрыта неровностями, болѣе выдающимися у молодыхъ экземпляровъ. Мускульные отпечатки замѣтны, связка продолговатая, мало выдается. — Размѣры раковины: длина 4", высота $1\frac{5}{8}$ ", ширина 1".

По всейѣ вѣроятности, и та форма *U. pictorum* изъ рѣки Уды, которая была прислана Мочульскимъ Симашко и которая, по словамъ этого послѣдняго, представляется весьма вытянутою и отличается соломенно-желтымъ цвѣтомъ, принадлежитъ къ описанной нами разности².

Кромѣ этой разности я имѣлъ возможность достать *U. pictorum* Rsm. изъ рр. Miusa и Кальміуса, которая отлична отъ харьковской и представляетъ намъ слѣдующія особенности. Раковина удлиненная, довольно толстая, мало вздутая. Наружная поверхность

¹ Loc. cit. Heft I. 1835. S. 118.

² Bemerkungen über einige Land- und Süsswasser-Mollusken Russlands. Bulletin de la classe phys. math. de l'Académie de science de St. Petersbourg. T. VIII. S. 238—239.

ровная, цвѣта темнозеленаго, переходящаго въ каштановый, часто съ двумя черными продольными полосами. Перламутровый слой молочно-блѣлаго цвѣта. Вершина съ мало-выдающимися неровностями, нѣсколько загнута къ замку. Зубецъ правой створки сжатъ и оканчивается лезвеемъ; передній зубецъ лѣвой створки также оканчивается лезвеемъ, а задній не развитъ. Мускульные отпечатки замѣтны. Связка короткая, выдается. Размеры раковины: длина $3\frac{3}{8}$ ", высота $1\frac{1}{4}$ ", ширина 1". Найденные мною экземпляры весьма часто были усажены *Mytilus polymorphus* Pall. и ракообразными изъ р. *Balanus*.

Unio tumidus Retz., *concha ovato-elongata, cuneata, tumida, posterius rostrata, crassa, fusca margin'e inferiore curvato; dentibus cardinalibus crassis, compressis, validis, sinistrorum posteriorre valide*¹.

Изъ вида *Unio tumidus* Rsm. найдены мною близъ Харькова двѣ разности:

1) Раковина толстая, тяжелая, вздутая, удлиненная. Наружная поверхность неровная, хотя и не можетъ быть названа бороздчатою, каштанового цвѣта съ темными полосами. Перламутровый слой молочно-блѣлаго цвѣта. Вершина очень приближена къ переднему краю и покрыта возвышениями. Верхній край прямой; передній и нижній края округлены; задній вытягивается и оканчивается заостреннымъ концомъ. Зубцы крѣпкие и весьма мало сжаты. Зубецъ правой створки почти одной величины съ заднимъ зубцомъ лѣвой створки. Передній зубецъ лѣвой створки оканчивается лезвеемъ, а другіе два тупы и зазубрены. Мускульные отпечатки глубоки. Связка длинная, выдающаяся. Размеры раковины: длина 5", высота $1\frac{7}{8}$ ", ширина $1\frac{1}{2}$ ". Найдена мною въ различныхъ мѣстахъ р. Лопани.

2) Отличается отъ описанной формы прежде всего своими размерами: длина $5\frac{1}{2}$ ", высота $2\frac{1}{2}$ ", ширина 2". Кромѣ того нижній край раковины имѣть большую кризину; задній конецъ нѣсколько приподнять кверху; высота относительно длины больше, такъ - что предыдущая форма представляется болѣе удлиненною. Найдена мною въ пруду Жукова, вмѣстѣ съ описанною формою *Anodonta anatina*. Замѣчательна своею величиною, такъ-какъ изъ описанія Rossmassler-a видно, что обыкновенно этотъ видъ достигаетъ небольшое $3\frac{1}{2}$ " длины.

¹ Loc. cit. Heft I. 1835. S. 117.

² Beitrag zur Kenntniss der Konchylien Russlands. Bulletin des nat. de Moscou. 1847. S. 126.

Предлагая описание отдельныхъ видоизмененій изъ р. *Anodonta* и *Unio*, найденныхъ мною близъ Харькова, я позволяю себѣ сдѣлать отступленіе въ концѣ моей статьи относительно вида *Unio Stevenianus* Kr., который найденъ Криницкимъ въ Крыму въ р. Салгирѣ. Въ коллекціи налдъ зоологического кабинета нашего университета хранятся экземпляры этого вида, для котораго, сколько мнѣ известно, не было еще представлено болѣе или менѣе точнаго описанія. Правда, Симашко², имѣвший *U. Stevenianus* отъ Куторги, считаетъ его за особенную разность *U. consentaneus* Ziegл., но также умалчиваетъ объ отличительныхъ признакахъ этой разности.

Unio (consentaneus) Ziegл., concha oblonge-ovovata, crassa, nigrofusca; ventricosa, postice in rostrum compressum, latum, rotundate-acutum producta; infra rectiuscula; umbonibus tumidis, extremitati anteriori perquam approximatis; dentibus cardinalibus parvis, subquadratis, compressiusculis, crenatis, lamellos distinctis¹.

Unio Stevenianus Kr. Раковина довольно толстая, вздутая, короткая. Наружная поверхность довольно ровная. Перламутровый слой молочно-блѣлаго цвѣта съ серебристымъ отливомъ или желтоватаго. Верхній край едва возвышается къ задней части; передній край закругленъ; задній оканчивается тупымъ концомъ; нижній слабо закрученъ, почти горизонталенъ. Вершина приподнята и покрыта едва замѣтными неровностями. Зубецъ правой створки крѣпкій, длина превышаетъ толщину, оканчивается тупымъ концомъ съ зубчиками, которые образуются бороздками, идущими по верхней сторонѣ зuba отъ основанія; передній зубецъ лѣвой створки имѣеть видъ усѣченного конуса, а задній, такой-же формы, слабѣе развитъ. Мускульные отпечатки явственны. Связка сломана и потому не можетъ быть определена степень ея поднятія. Размеры раковины: длина $2\frac{1}{2}$, высота $1\frac{1}{3}$ ", ширина 1".

Unio Stevenianus подходитъ дѣйствительно къ *U. consentaneus* Ziegл., и при этомъ— болѣе къ тѣмъ формамъ, которыхъ доставлены Rossmassler-у Schmid-омъ и о которыхъ онъ упоминаетъ отдельно при описаніи этого вида.

¹ Iconographie etc. Hf. III. 1836. S. 29—30.

